

# Impfkalender

Stand: Juli 2008 nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Impfstoff/ Antigen-Kombinationen	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren					
	Geburt	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-11	12-17	ab 18	ab 60
Wundstarrkrampf (Tetanus)		1.	2.	3.	4.		A	A		A <sup>d)</sup>	A <sup>d)</sup>
Diphtherie		1.	2.	3.	4.		A	A		A <sup>d)</sup>	A <sup>d)</sup>
Keuchhusten (Pertussis)		1.	2.	3.	4.		A	A			
Haemophilus influenza Typ b Hib		1.	2. <sup>a)</sup>	3.	4.						
Kinderlähmung (Polio)		1.	2. <sup>a)</sup>	3.	4.			A			
Hepatitis B	1.		2. <sup>a)</sup>	3.	4.			G			
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.						S
Meningokokken					1. <sup>c)</sup>						
Masern, Mumps, Röteln (MMR)					1.	2.					
Windpocken (Varizellen)					1.	2. <sup>e)</sup>		f)			
Grippe <sup>b)</sup> (Influenza)											S
HPV <sup>g)</sup> (Humane Papillomaviren)									SM		

**A** Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen.

**G** Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes

**S** Standardimpfungen

**SM** Standardimpfungen für Mädchen

a) Bei Einzelimpfstoffen oder Impfstoffen ohne Keuchhustenanteil kann diese Dosis entfallen.

b) Jährlich mit aktuellem Impfstoff

c) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

d) Auffrischung alle 10 Jahre

e) Bei Verwendung eines MMR-Varizellenimpfstoffes: Gabe einer zweiten Dosis bevorzugt nach 6 Wochen (mindestens 4 Wochen)

f) Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung

g) Impfung mit 3 Dosen für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren